

SRP **plus** PerioChip®

# Das eingespielte Team bei chronischer Parodontitis



**PerioChip®**

Die zuverlässige Lösung  
in der Parodontitis-Therapie

# Was ist PerioChip®

PerioChip® ist ein hauchdünner Matrix-Chip zur unterstützenden Parodontitis-Therapie, welcher sich 7 Tage nach der Applikation vollständig auflöst und somit nicht entfernt werden muss.

- › Wirksam - Eliminiert bis zu 99 % der pathogenen Keime
- › Schnell - Applikation in nur 1 Minute
- › Nachhaltig - Keimfernhaltend bis zu 11 Wochen
- › Beständig - Essentieller Teil eines parodontalen Behandlungsprogramms

## SRP **plus** PerioChip®

### Zusammen erstklassig


Für bestmögliche Therapieerfolge bei chronischer Parodontitis ist **neben einer SRP\* wichtig, die Zahnfleischtaschen medikamentös zu versorgen**. Das übernimmt PerioChip® mit seinem hochkonzentrierten Wirkstoff (ca. 36 %) Chlorhexidinbis(D-gluconat).

Die minimalinvasive Therapie SRP **plus** PerioChip® sollte einem chirurgischen Eingriff vorgezogen werden. Bringt diese nicht den gewünschten Behandlungserfolg, ist der chirurgische Eingriff noch immer eine Option.



SRP **plus** PerioChip®  
**reduziert Taschentiefen  
signifikant besser** als SRP allein.<sup>1</sup>

# Freisetzungprofil von PerioChip®



- › Wirkstoffkonzentration in den ersten 24 Stunden am höchsten
- › Garantierte Dosis von 125 µg/ml in den ersten 7 Tagen
- › Langsame Abnahme der Chlorhexidinkonzentration in 7 Tagen



Die zuverlässige  
Lösung in der  
Parodontitis-Therapie

# Schnell und einfach appliziert – in nur einer Minute



**1.**

Nach Taschenreinigung den PerioChip® vorsichtig mit der Pinzette aus dem Einzelblister entnehmen.



**2.**

Mit der abgerundeten Seite voran in die parodontale Tasche applizieren.



**3.**

Den PerioChip® anschließend auf den Taschenfundus schieben.



**Für bestmögliche Therapieerfolge:**

PerioChip® alle 3 Monate applizieren.

Für **Zahnfleischtaschen ab 5 mm** Tiefe.

SRP **plus** PerioChip®

## Langfristig und nachhaltig therapieren

Ein **3-Monats-Recall** gewährleistet eine rechtzeitige Wiederholung der Chip-Applikation, um den **Behandlungserfolg abzusichern**.

SRP **plus** PerioChip®:

Signifikante Reduktion der Taschentiefe um 73 % durch regelmäßige Recalls über 2 Jahre nachgewiesen.<sup>2</sup>



## Optimal für die Langzeittherapie

- › PerioChip® löst sich vollständig auf
- › Antibiotikafrei
- › Applikation kann beliebig oft wiederholt werden

# Einfach effektiv in der Parodontitis-Therapie



Bestellen Sie PerioChip® bei unserem kostenfreien Beratungsservice:  
**0800 284 37 42** oder unter **www.periochip.de**  
Für Österreich: **0800 293 628**

Dexcel® Pharma GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 2, 63755 Alzenau, Deutschland

## PerioChip® 2,5 mg Insert für Parodontaltaschen

**Wirkst.:** Chlorhexidinbis(D-gluconat). **Zus.:** 2,5 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat). **Sonst. Best.:** Hydrolysierte Gelatine (vernetzt mit Glutaraldehyd), Glycerol, Gereinigtes Wasser. **Anw.:** In Verb. mit Zahnsteinentfernung u. Wurzelbehandlung zur unterstütz. bakteriostat. Behandl. von mäßigen bis schweren chron. parodont. Erkr. m. Taschenbild. b. Erwachsenen, Teil eines parodont. Behandl. programms. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Chlorhexidinbis (D-gluconat) o. ein. der sonst. Bestandt. **Nebenw.:** Bei ungef. einem Drittel der Patienten treten während der ersten Tage n. Einleg. des Chips Nebenw. auf, die normalerweise vorübergeh. Natur sind. Am häufigsten treten Reakt. an den Zähnen, am Zahnfleisch o. den Weichteilen im Mund auf. Infekt. der ob. Atemwege, Lymphadenopathie, Schwindel, Neuralgie, Zahnschmerzen, Zahnfleischschwellung, -schmerz., -blutung., Zahnfleischhyperplasie, -schrumpfung, -juckreiz, Mundgeschwüre, Zahnempfindlichkeit, Unwohlsein, grippeäehn. Erkrank., Pyrexie, system. Überempfindlichkeit (einschl. anaph. Schock), Weichteilnekrose, Zellgewebsentzündung u. Abszess am Verabreichungsort, Geschmacksverlust u. Zahnfleischverfärbung. **Weitere Hinw.:** s. Fachinform. **Apothekenpflichtig. Stand:** 10/2014. **Pharmaz. Untern.:** Dexcel® Pharma Ltd., 7 Sopwith Way, Drayton Fields, Daventry, Northamptonshire, NN11 8PB, UK. **Mitvertreiber:** Dexcel® Pharma GmbH, Carl-Zeiss-Straße 2, 63755 Alzenau, Deutschland, Tel.: 06023/9480-0, Fax: 06023/9480-50

<sup>1</sup> Soskolne, W.A. et al. (1997): Sustained Local Delivery of Chlorhexidine in the Treatment of Periodontitis. A Multi-Center Study. J Periodontol, Vol. 68, Nr. 1, p. 32-36.

<sup>2</sup> Soskolne, W.A. et al. (2003): Probing Depth Changes Following 2 Years of Periodontal Maintenance Therapy Including Adjunctive Controlled Release of Chlorhexidine. J Periodontol, Vol. 74, Nr. 4, p. 420 - 427.